

Feuille d'exercices n°2 : Chaînes de Markov : exemples et propriétés.

Exercice 13. [Mesure stationnaire] On rappelle que la matrice de transition de la marche aléatoire sur un graphe $G = (V, E)$ sans sommet isolé est définie par

$$P(x, y) = \frac{\mathbf{1}_{x \sim y}}{\deg x},$$

où $\deg x$ est le nombre de voisins de x , et $\mathbf{1}_{x \sim y}$ est l'indicatrice des voisins de x . Pour $n \geq 3$, on pose $V = \{1, 2, \dots, n\}$, et on définit les ensembles d'arêtes

$$E = \{\{x, y\}, |x - y| = 1\} \quad ; \quad E' = E \cup \{\{1, n\}\}$$

Soit P la matrice de transition de la marche aléatoire sur le segment (V, E) , et Q celle de la marche aléatoire sur le n -cycle (V, E') .

1. Décrire les deux matrices de transition P et Q . Sont-elles irréductibles ?
2. Calculer par la méthode de votre choix la mesure de probabilité stationnaire de chacune de ces deux matrices de transition.

Exercice 14. [Urne de Polya] On considère une urne composée d'une boule blanche et d'une boule noire à l'instant initial $t = 0$. À chaque instant $t \geq 0$, on choisit une boule uniformément au hasard dans l'urne, qu'on remplace ensuite avec une boule de même couleur pour donner la composition de l'urne à l'instant $t + 1$. On note (N_t, B_t) le nombre de boules noires et blanches respectivement à l'instant t .

1. Quelle est pour tout entier $t \in \mathbb{N}$ la valeur du nombre total de boules dans l'urne à l'instant t , $N_t + B_t$?
2. Préciser la matrice de transition de la chaîne de Markov $(N_t, N_t + B_t)_{t \in \mathbb{N}}$ sur l'espace $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$.
3. Montrer que pour tout entier $t \in \mathbb{N}$, N_t suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, t + 1\}$.

Exercice 15. [Ruine du joueur] On considère $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur $\Omega = \{0, \dots, n\}$ de matrice de transition

$$P(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{2} \mathbf{1}_{\{|j-i|=1\}} & \text{si } i \in \{1, \dots, n-1\} \\ \mathbf{1}_{i=j} & \text{si } i \in \{0, n\}. \end{cases}$$

Il s'agit de la marche aléatoire des gains d'un joueur qui joue à un jeu équilibré, gagne ou perd 1 à chaque tour de jeu et s'arrête lorsqu'il atteint un gain de n ou lorsqu'il atteint 0 et n'a plus d'argent à parier. On s'intéresse au temps aléatoire $\tau = \min\{t \geq 0, X_t \in \{0, n\}\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, et plus précisément à la loi de la variable aléatoire X_τ (qui est définie sur l'événement $\{\tau < \infty\}$).

1. Soit $k \in \Omega \setminus \{0, n\}$. Écrire l'événement $\{\tau = t\}$ en fonction de $(X_s, 0 \leq s \leq t)$. Justifier soigneusement l'égalité suivante à l'aide de la propriété de Markov :

$$\mathbb{P}_k[\tau = t + 1 \mid X_1 = k + 1] = \mathbb{P}_{k+1}[\tau = t].$$

2. En déduire, pour $k \in \Omega \setminus \{0, n\}$,

$$\mathbb{P}_k[\tau < \infty \mid X_1 = k + 1] = \mathbb{P}_{k+1}[\tau < \infty]$$

et

$$\mathbb{E}_k[\tau \mid X_1 = k + 1] = 1 + \mathbb{E}_{k+1}[\tau].$$

Pour la seconde identité, noter qu'on ne sait pas si la variable aléatoire τ est p.s. finie, mais comme elle est positive ou nulle, son espérance est bien définie.

3. Soit $k \in \Omega$. Posons $f(k) = \mathbb{P}_k[\tau < \infty]$. Donner $f(0)$ et $f(n)$, et montrer que :

$$f(k) = \frac{1}{2}f(k-1) + \frac{1}{2}f(k+1), \quad k \in \Omega \setminus \{0, n\}.$$

Trouver l'unique solution de ce système d'équations.

4. Soit $k \in \Omega \setminus \{0, n\}$. Justifier soigneusement l'égalité suivante à l'aide de la propriété de Markov :

$$\mathbb{P}_k[\tau < \infty \text{ et } X_\tau = n \mid X_1 = k + 1] = \mathbb{P}_{k+1}[\tau < \infty \text{ et } X_\tau = n].$$

Soit $k \in \Omega$. Posons $g(k) = \mathbb{P}_k[\tau < \infty \text{ et } X_\tau = n]$. Expliciter $g(0)$ et $g(n)$, et donner l'équation de récurrence satisfaite par g . Résoudre ce système.

5. Soit $k \in \Omega$. Posons $h(k) = \mathbb{E}_k[\tau]$. Expliciter $h(0)$ et $h(n)$, et donner l'équation de récurrence satisfaite par h . Résoudre ce système (on pourra poser $\ell(k) = h(k+1) - h(k)$).
6. Pour cette dernière question, on modifie les probabilités de transition depuis l'état 0 en supposant que $P(0, 1) = 1$ (autrement dit, le joueur est un addict et il se remet à jouer immédiatement après avoir perdu). On pose $\tilde{\tau} = \min\{t \geq 0, X_t = n\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, et $\tilde{h}(k) = \mathbb{E}_k(\tilde{\tau})$. Donner $\tilde{h}(0) - \tilde{h}(1)$ et $\tilde{h}(n)$. Montrer que \tilde{h} vérifie la même équation de récurrence que h , et la résoudre.

Exercice 16. [Théorème de représentation] Soit Ω un ensemble fini, et \mathcal{E} un espace mesurable.

1. On suppose donnée une fonction mesurable $f : \Omega \times \mathcal{E} \rightarrow \Omega$ et une suite de variables aléatoires i.i.d. $(\xi_t)_{t \geq 0}$ à valeurs dans \mathcal{E} . Si $k, l \in \Omega$, on note $P(k, l) = \mathbb{P}[f(k, \xi_0) = l]$. Soit X_0 une variable aléatoire à valeurs dans Ω et indépendante des ξ_t . On définit par récurrence la suite $(X_t)_{t \geq 0}$ par

$$X_{t+1} = f(X_t, \xi_t).$$

Montrer que pour toute suite $(x_0, \dots, x_t) \in \Omega^{t+1}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{0 \leq s \leq t} \{X_s = x_s\}\right) = \mathbb{P}(X_0 = x_0) P(x_0, x_1) \cdots P(x_{t-1}, x_t).$$

En déduire que X est une chaîne de Markov de matrice de transition P .

2. On se donne réciproquement une matrice stochastique P sur $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$, et une suite de variables aléatoires $(\xi_t)_{t \in \mathbb{R}}$ i.i.d. uniformes dans $[0, 1]$. On définit une fonction

$$f : \Omega \times [0, 1] \rightarrow \Omega$$

$$(k, x) \mapsto \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{x \geq \sum_{j=0}^{i-1} P(k, j)} P(k, i).$$

Montrer que $P(k, l) = \mathbb{P}[f(k, \xi_0) = l]$. En déduire que toute chaîne de Markov sur Ω peut être représentée en loi par une chaîne $(X_t)_{t \geq 0}$ définie par la relation de récurrence $X_{t+1} = f(X_t, \xi_t)$, avec une suite de variables i.i.d. $(\xi_t)_{t \geq 0}$.

Exercice 17. [Collecteur de coupons²] Soit $(X_t)_{t \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On s'intéresse à la variable aléatoire

$$Y_t = |\{X_s, 1 \leq s \leq t\}|$$

soit le cardinal de l'ensemble des valeurs distinctes prises par les X_s jusqu'à l'instant t inclus. On s'intéresse dans cet exercice au temps d'atteinte d'un niveau donné par cette chaîne.

- Observer que $Y_t \in \{0, 1, \dots, t \wedge n\}$, et que les trajectoires $t \mapsto Y_t$ sont croissantes. Montrer que $(Y_t)_{t \geq 0}$ est une chaîne de Markov sur $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$ et donner sa matrice de transition.
- On note $\tau_k = \min\{t \geq 1, Y_t = k\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ le temps d'atteinte de $k \in \{1, \dots, n\}$. Reconnaître la loi de $\mathbf{1}_{\tau_k < \infty} (\tau_{k+1} - \tau_k)$, puis en déduire que

$$\mathbb{P}(\tau_k < \infty) = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[\tau_k] = n \sum_{j=n-k+1}^n \frac{1}{j}.$$

Donner un équivalent de $\mathbb{E}[\tau_k]$ lorsque

- $n \rightarrow \infty$ avec $\frac{k}{n} \rightarrow \alpha \in (0, 1)$;
- $n \rightarrow \infty$ avec $\frac{\log n - k + 1}{\log n} \rightarrow 0$ (par exemple, $k = n$).

Comparer en particulier le temps nécessaire pour atteindre $n/2$ et n .

- Calculer la probabilité de l'événement $A_i^t = \bigcap_{1 \leq s \leq t} \{X_s \neq i\}$. Exprimer l'événement $\{\tau_n > t\}$ en fonction des A_i^t puis en déduire la majoration : pour tout $c > 0$,

$$\mathbb{P}(\tau_n > \lceil n \log n + cn \rceil) \leq \exp(-c),$$

où $\lceil x \rceil$ désigne l'entier au dessus de x (le "plafond" de x en anglais), $\lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$.

Exercice 18. [Chaîne image] Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une chaîne de Markov à valeurs dans Ω et de matrice P , et $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ une fonction surjective. On pose $Y_t = f(X_t)$, et on suppose que, pour tout $y_1, y_2 \in \Omega'$, la probabilité de transition $P(x, f^{-1}\{y_2\})$ est la même pour tout $x \in f^{-1}\{y_1\}$. On note alors cette quantité $Q(y_1, y_2)$.

- Vérifier que Q est une matrice stochastique sur Ω' .
- Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{N}$ et $(y_s)_{0 \leq s \leq t} \in (\Omega')^{t+1}$,

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{0 \leq s \leq t} \{Y_s = y_s\} \right) = \mathbb{P} \left(\bigcap_{0 \leq s \leq t-1} \{Y_s = y_s\} \right) Q(y_{t-1}, y_t)$$

et en déduire que $(Y_t)_{t \geq 0}$ est une chaîne de Markov sur Ω' de matrice de transition Q .

- On appelle mesure image de π par f la mesure de probabilité ν sur Ω' définie par $\nu(y) = \pi(f^{-1}\{y\})$, $y \in \Omega'$. Si π est une mesure stationnaire pour P , que dire de la mesure image de π par f ?

2. Interprétation : une collection d'images compte n images différentes ; leur achat chez notre marchand de journaux peut être modélisé par un tirage avec remise ; la question est de savoir en fonction de n quand est-ce que l'on a une collection complète.

Exercice 19. [Urne d'Erhenfest³] Soit $n \geq 1$. Le graphe $G = (V, E)$ défini par

$$V = \{0, 1\}^n \text{ et } E = \{\{x, y\} \in V^2 : \sum_{1 \leq i \leq n} |x(i) - y(i)| = 1\}$$

s'appelle l'hypercube de dimension n . On considère la marche aléatoire simple $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ sur ce graphe. L'application somme des coordonnées $f : x \in V \mapsto \sum_{1 \leq i \leq n} x(i) \in \{0, \dots, n\}$ appliquée à $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ donne $(Y_t = f(X_t))_{t \in \mathbb{N}}$.

1. Représenter le graphe obtenu pour $n = 2$ et $n = 3$, et justifier ainsi le nom d'hypercube pour le graphe $G = (V, E)$.
2. Quel est le degré des sommets de G ?
3. Donner la matrice de transition P de la chaîne $(X_t)_{t \geq 0}$. Est-elle irréductible ? Montrer que P admet une unique mesure de probabilité stationnaire π , et la préciser.
4. Vérifier à l'aide du résultat de l'exercice 18 par exemple que $(Y_t)_{t \geq 0}$ est encore une chaîne de Markov. Donner sa matrice de transition Q . Est-elle irréductible ?
5. On appelle mesure image de π par f la mesure ν sur $\{0, \dots, n\}$ définie par $\nu(k) = \pi(f^{-1}\{k\})$, $k \in \{0, \dots, n\}$. Déterminer ν et vérifier que Q est réversible par rapport à la mesure de probabilité ν .
6. En déduire à l'aide du cours la valeur de $g(k) = \mathbb{E}_k[\tau_k^+(Y)]$. Calculer la limite de

$$\frac{1}{n} \log(g(k))$$

lorsque $n \rightarrow \infty$ et $\frac{k}{n} \rightarrow \alpha \in (0, 1)$. Donner enfin un équivalent de $g(\frac{n}{2})$ (on pourra s'aider de la formule de Stirling $n! \sim (\frac{n}{e})^n \sqrt{2\pi n}$),

Exercice 20. [Chaîne de naissance et mort] Soit $\Omega := \{0, 1, \dots, n\}$. On appelle chaîne de naissance et mort une chaîne de Markov dont la matrice de transition est tridiagonale, c'est-à-dire telle que $P(i, j) = 0$ si $|i - j| \geq 2$. On notera $p_i = P(i, i + 1)$, $q_i = P(i, i)$ et $r_i = P(i, i - 1)$ avec la convention que r_0 et p_n valent tous deux 0. Posons $w_0 = 1$ et pour $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$w_j = \frac{\prod_{0 \leq i \leq j-1} p_i}{\prod_{1 \leq i \leq j} r_i}.$$

1. Faire un dessin de Ω et indiquer sur ce même schéma les probabilités de transition entre les états de Ω . Donner une CNS pour que la chaîne soit irréductible. On supposera cette condition satisfaite dans la suite de l'exercice.
2. Montrer que P est réversible et exprimer son unique loi stationnaire π à l'aide des quantités $(w_j)_{0 \leq j \leq n}$.

L'objectif de la suite de l'exercice est d'estimer les quantités $\mathbb{E}_k[\tau_\ell]$. Pour $\ell \in \{1, \dots, n\}$, on pose $\Omega_\ell := \{0, 1, \dots, \ell\}$ et

$$P_\ell(x, y) = P(x, y) \text{ si } x, y \in \Omega_\ell \setminus \{(\ell, \ell)\} \text{ et } P_\ell(\ell, \ell) = p_\ell + q_\ell$$

3. Interprétation de ce modèle, introduit en 1907 par les époux Ehrenfest pour illustrer certains des paradoxes apparus dans les fondements de la mécanique statistique : on dispose de 2 urnes qui comprennent au total n boules, et, à chaque instant, une boule choisie au hasard parmi les n boules est changée d'urne ; on veut alors comprendre la répartition des boules dans les 2 urnes.

P_ℓ définit encore une matrice de transition, et on note $(\tilde{X}_t)_{t \in \mathbb{N}}$ la chaîne de Markov associée à P_ℓ , et X la chaîne de Markov associée à P . On pose pour $0 \leq \ell \leq n$, $\tau_k^+ = \inf\{t \geq 1 : X_t = k\}$ et $\tau_k = \inf\{t \geq 0 : X_t = k\}$ les temps de retour et d'atteinte pour X , et, pour $0 \leq k \leq \ell$, $\tilde{\tau}_k^+ = \inf\{t \geq 1 : \tilde{X}_t = k\}$ et $\tilde{\tau}_k = \inf\{t \geq 0 : \tilde{X}_t = k\}$ ceux pour \tilde{X} .

3. Montrer que P_ℓ est réversible et exprimer son unique loi stationnaire π_ℓ à l'aide des $(w_j)_{0 \leq j \leq \ell}$. Que peut-on dire de π_ℓ et de $\pi_{\{0, \dots, \ell\}}$?
4. Exprimer $\mathbb{E}_\ell[\tilde{\tau}_\ell^+]$ en fonction de $\mathbb{E}_{\ell-1}[\tau_\ell]$, et en déduire la valeur de cette dernière quantité en fonction des paramètres $(w_j)_{0 \leq j \leq \ell-1}$ et $(r_j)_{0 \leq j \leq \ell-1}$.
5. En déduire la valeur de $\mathbb{E}_k[\tau_\ell]$ pour tous $0 \leq k < \ell \leq n$.

Exercice 21. [Lemme de la cible aléatoire] Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ chaîne de Markov de matrice de transition P irréductible sur Ω , qui admet une mesure de probabilité stationnaire π . On pose

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \mathbb{E}_x[\tau_{V_\pi}] := \sum_{z \in \Omega} \pi(z) \mathbb{E}_x[\tau_z].$$

1. Montrer proprement que pour tout $x, z \in \Omega$,

$$\mathbb{E}_x[\tau_z^+] = 1 + \sum_{y \in \Omega} P(x, y) \mathbb{E}_y[\tau_z].$$

2. En déduire que la fonction f est harmonique pour P sur Ω . On pourra utiliser la relation vue en cours entre $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$ et $\pi(x)$.
3. Que peut-on en déduire sur la fonction f ? Interpréter ce résultat.

Exercice 22. [Dernier site occupé] On considère la marche aléatoire $(X_t)_{t \geq 0}$ sur le $(n \geq 3)$ -cycle :

$$G = (V, E) \quad ; \quad V = \{1, 2, \dots, n\} \quad ; \quad E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots, \{n-1, n\}, \{n, 1\}\}.$$

On convient dans ce qui suit que $n+1 = 1$ (autrement dit, $V = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). On note $\tau_x = \min\{t \geq 0 \mid X_t = x\}$ le temps d'atteinte de x , et Y le dernier site visité par la marche aléatoire, formellement défini par

$$\{Y = y\} = \{\tau_y = \max_{1 \leq x \leq n} \tau_x\}.$$

1. Expliquer pourquoi

$$\{Y = y\} = \{\tau_{y-1} < \tau_{y+1} < \tau_y\} \cup \{\tau_{y+1} < \tau_{y-1} < \tau_y\}.$$

2. Montrer que, pour tout $y \in \{1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}_{y-1}(\tau_{y+1} < \tau_y) = \frac{1}{n-1}.$$

On pourra trouver un système d'équations pour la fonction $f(k) = \mathbb{P}_k[\tau_{y+1} < \tau_y]$, et résoudre ce système.

3. En déduire la valeur de $\mathbb{P}_x[Y = y]$, et reconnaître la distribution de la variable aléatoire Y . Commenter ce résultat.