

Mouvement d'une étoile dans un potentiel pseudo-képlérien

On considère le mouvement d'une étoile dans le potentiel de champ moyen d'une galaxie de la forme

$$\psi = -GM(u + au^2) \quad (1)$$

avec $u = 1/r$ inverse de la distance de l'étoile au centre galactique, et a un paramètre réel strictement négatif.

1. Indiquer pourquoi le mouvement de l'étoile s'effectue dans un plan.
2. Quelles sont les grandeurs conservées lors du mouvement ?
3. Calculer la densité associée au potentiel (1), en déduire que a est nécessairement négatif. Interpréter $|a|$ sachant que la masse de la galaxie est M .
4. Montrer que l'équation polaire du mouvement s'écrit

$$u = \alpha \cos [K(\varphi - \varphi_0)] + \frac{GM}{K^2 L^2}$$

avec

$$\alpha \in \mathbb{R}^+, K = \sqrt{1 - \frac{2GMa}{L^2}}, \varphi_0 = \varphi(t=0)$$

5. Montrer que si

$$\left. \frac{du}{d\varphi} \right|_{t=0} = 0 \quad (2)$$

alors l'énergie totale de l'étoile par unité de masse est donnée par la relation

$$E = \frac{1}{2} K^2 L^2 \alpha^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{GM}{KL} \right)^2$$

en déduire que l'orbite d'une étoile de vitesse angulaire initiale nulle est bornée si l'on a

$$u(t=0) < \frac{2GM}{K^2 L^2} \quad (3)$$

6. Indiquer dans les conditions (3) et (2) les caractéristiques de l'orbite d'une étoile dans cette galaxie.